切り取ってご使用下さい。

テレミンソフト坐薬10mgをお使いの方へ

1. 坐剤の取り出し方

ⓐミシン目にそって、1個分を切り離します。



ⓑ右図の要領で静かに左右に開いて坐剤を取り出します。

2. 挿入の仕方

ⓐ坐剤の後部をガーゼなどでつまみ、先端から肛門に挿入します。

ⓑ中腰になって坐剤を挿入し、立ち上がると簡単に正しい位置に入ります。

3. 挿入後の注意

・挿入直後は異物感が残りますが、しばらくすると異物感はなくなっていきます。

・坐剤が外に出ないようにするため、挿入直後は、激しい運動をさけてください。

4. その他の注意

・このお薬は口から飲まないでください。

・このお薬は体温で溶けるように設計されています。

・陽のあたらない、なるべく涼しいところ（冷蔵庫など）で凍結をさけて保管してください。

J-1

テレミンソフト坐薬10mgをお使いの方へ

1. 坐剤の取り出し方
ⓐミシン目にそって、1個分を切り離します。
ⓑ右図の要領で静かに左右に開いて坐剤を取り出します。
2. 挿入の仕方
ⓐ坐剤の後部をガーゼなどでつまみ、先端から肛門に挿入します。
ⓑ中腰になって坐剤を挿入し、立ち上がると簡単に正しい位置に入ります。
3. 挿入後の注意
・挿入直後は異物感が残りますが、しばらくすると異物感はなくなっていきます。
・坐剤が外に出ないようにするため、挿入直後は、激しい運動をさけてください。
4. その他の注意
・このお薬は口から飲まないでください。
・このお薬は体温で溶けるように設計されています。
・陽のあたらない、なるべく涼しいところ（冷蔵庫など）で凍結をさけて保管してください。
J-1

テレミンソフト坐薬10mgをお使いの方へ

1. 坐剤の取り出し方
ⓐミシン目にそって、1個分を切り離します。
ⓑ右図の要領で静かに左右に開いて坐剤を取り出します。
2. 挿入の仕方
ⓐ坐剤の後部をガーゼなどでつまみ、先端から肛門に挿入します。
ⓑ中腰になって坐剤を挿入し、立ち上がると簡単に正しい位置に入ります。
3. 挿入後の注意
・挿入直後は異物感が残りますが、しばらくすると異物感はなくなっていきます。
・坐剤が外に出ないようにするため、挿入直後は、激しい運動をさけてください。
4. その他の注意
・このお薬は口から飲まないでください。
・このお薬は体温で溶けるように設計されています。
・陽のあたらない、なるべく涼しいところ（冷蔵庫など）で凍結をさけて保管してください。
J-1

テレミンソフト坐薬10mgをお使いの方へ

1. 坐剤の取り出し方
ⓐミシン目にそって、1個分を切り離します。
ⓑ右図の要領で静かに左右に開いて坐剤を取り出します。
2. 挿入の仕方
ⓐ坐剤の後部をガーゼなどでつまみ、先端から肛門に挿入します。
ⓑ中腰になって坐剤を挿入し、立ち上がると簡単に正しい位置に入ります。
3. 挿入後の注意
・挿入直後は異物感が残りますが、しばらくすると異物感はなくなっていきます。
・坐剤が外に出ないようにするため、挿入直後は、激しい運動をさけてください。
4. その他の注意
・このお薬は口から飲まないでください。
・このお薬は体温で溶けるように設計されています。
・陽のあたらない、なるべく涼しいところ（冷蔵庫など）で凍結をさけて保管してください。
J-1